



Optigard® Formiga

Gel

(TIAMETOXAM)

Produto indicado para o controle de formigas urbanas.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Peso Líquido: 4 seringas com 30 g cada

“Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, “shopping centers”, residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros.”

COMPOSIÇÃO

Ingrediente Ativo: TIAMETOXAM.....0,01% m/m
Inertes: atrativo, preservante, espessante, neutralizador, agente amargo, solvente:.....99,99% m/m

MODO DE USAR

OPTIGARD FORMIGA GEL vem pronto para uso com seringa e êmbolo, ou pode ser utilizado com pistola aplicadora.

Aplicar pequenos pontos ou filetes de **OPTIGARD FORMIGA GEL** (aproximadamente 1 grama do produto por ponto ou 0,5 g/m²) em frestas, fendas, cantos e caminhos onde as formigas forrageiam ou se abrigam, como embaixo e atrás de pias e bancadas, ao redor de janelas e portas de entrada etc. Deve-se ter atenção especial nos locais onde seja observado forrageamento ativo ou entrada de formigas na estrutura; reaplicar nos locais infestados após 14 dias, repetindo a aplicação até o desaparecimento da infestação. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 14 dias.

Aplicação em áreas internas:

Inspeccionar o ambiente e aplicar o produto em locais com presença de formigas. Locais úmidos e/ou pontos de entrada são bons locais para aplicação da isca, tais como: fissuras e fendas nas cozinhas e banheiros, abrigos sob pias, janelas e portas de entrada, ventiladores etc. Nas áreas com muitas trilhas e/ou forrageamento intenso, aplicar a isca em vários pontos e próximo aos acessos do inseto. Durante visitas de monitoramento deve-se inspecionar a área e reaplicar conforme necessário. Não colocar a isca em áreas frequentemente lavadas, uma vez que a lavagem irá remover ou diluir a isca; Não aplicar em superfícies de preparação de alimentos.

Aplicação em locais com manipulação de alimentos:

Aplicar **OPTIGARD FORMIGA GEL** diretamente em frestas, fendas e outras pequenas aberturas onde as formigas possam entrar e se abrigar. Aplicar até 1 g de gel por ponto ou 0,5 g/m². Aplicar a isca entre os diferentes elementos de construção, como espaços entre equipamentos e pisos, nas bases dos equipamentos, paredes, rodapés, portas e janelas, armários, pias, fogões e outros equipamentos. Dar atenção especial nos pontos estratégicos por onde formigas podem entrar na estrutura. Durante visitas de monitoramento inspecionar a área e reaplicar conforme necessário. Não aplicar o produto em superfícies de manipulação de alimentos e utensílios que possam ser contaminados com a isca.

Para um desempenho ideal:

Evite o contato de água com o produto. Não utilize inseticida aerossol próximo aos locais de aplicação do produto. Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais. Durante as visitas de monitoramento deve-se inspecionar as iscas e reaplicar quando necessário. Este produto pode ser usado em conjunto com OPTIGARD LT, um inseticida não-repelente. Aplicar após a aplicação com inseticida não-repelente secar. Evitar aplicar o inseticida sobre a isca a fim de evitar a redução da palatabilidade da isca.

Intervalo entre aplicações: A empresa profissional de controle de pragas deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados e a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 14 dias.

PRECAUÇÕES

• CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar, comer ou beber durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

• CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas de borracha impermeável, protetor ocular e máscara de proteção com filtro adequado.
- Em caso de acidente com derrame de produto, recolha o mesmo com absorvente inerte (terra, serragem, sílica gel ou outro) e consulte a empresa registrante através do número de telefone indicado no rótulo para a destinação final adequada.
- Para o descarte de embalagens, siga as recomendações do órgão municipal, estadual ou federal competente.
- As embalagens após o uso total da isca devem ser embaladas, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviar para incineração, distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consulte a Syngenta, distribuidor ou órgão ambiental sobre o procedimentos adequados.

FABRICADO POR

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Rod. Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, km 127,5 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

IPANEMA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP CNPJ: 64.687.015/0001-52 - CEP: 18190-000.

AMERICAN BLENDING AND FILLING

3505 Birchwood Drive - Waukegan, IL 60085
EPA establishment number 71681-IL-0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro no M.S. nº: 3.0119.6645.001-0

Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº: 04215750 - IV Região - SP

OPTIGARD e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: NEONICOTINÓIDE

Nome comum: TIAMETOXAM

Antídoto: TRATAMENTO SINTOMÁTICO

Telefone de emergência: 0800 704 4304

Nº de Lote	2 anos a partir da data de fabricação
Data de Fabricação	
Prazo de Validade	